

Resultados de la encuesta

Acerca de la encuesta

La iniciativa de salud pública de la American Academy of Family Physicians (AAFP; Academia Estadounidense de Médicos Familiares) **La vacunación importa: Ayude a proteger de la tos ferina a toda la familia** tiene la finalidad de hacer ver al público la gravedad de esta enfermedad (llamada también *pertussis*) y la importancia de vacunar contra la tos ferina a adolescentes y adultos.

Datos sobresalientes de la encuesta

- ❖ **Más de tres cuartas partes** de los adultos (76%) no sabían o no creían que la tos ferina seguía estando extendida en Estados Unidos.
- ❖ **Más de la mitad** (56%) dijeron tener muy poco o ningún temor de contraer la enfermedad, pese a que los expertos en salud estiman que cada año hay en Estados Unidos hasta 600,000 casos de tos ferina en adultos.
- ❖ **La mayoría** de los adultos (72%) no estaban seguros o no sabían que la protección que brinda la vacunación infantil contra la tos ferina desaparece con el tiempo, con lo que ellos y otras personas desprotegidas quedan susceptibles a contraerla. Los bebés que no han recibido la vacuna contra la tos ferina y todos sus refuerzos son especialmente vulnerables.
- ❖ **Muchos** adultos (42%) dijeron haber recibido durante los diez años anteriores una vacuna Td, que brinda protección contra dos enfermedades: tétanos y difteria; sin embargo, **más de la mitad** (61%) ni siquiera sabían que existía una vacuna que protege del tétanos, la difteria y la tos ferina: la vacuna Tdap.
- ❖ Cuando se les preguntó si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que la mayoría de los adolescentes y adultos se vacunen contra la tos ferina, **más de la mitad** de los adultos (57%) dijeron no estar seguros.
- ❖ **La mayoría** de los adultos (73%) creían estar al día en sus vacunaciones, pero los CDC estiman que solamente 2.1 por ciento de los adultos recibieron una vacuna Tdap entre 2005 y 2007.

Otros datos sobre la tos ferina

- ❖ La tos ferina es una enfermedad respiratoria grave y muy contagiosa que suele comenzar como un resfriado y con el tiempo se convierte en una tos persistente.
- ❖ La protección contra la tos ferina desaparece entre cinco y diez años después de terminado el esquema de vacunación de la niñez, de modo que los adolescentes y adultos quedan susceptibles a contraerla.
- ❖ La persona que tiene tos ferina puede no saberlo y entonces contagiar la infección a otras, especialmente a niños pequeños. Los bebés que no han recibido la vacuna contra la tos ferina y todos sus refuerzos corren el riesgo de contraer la enfermedad.
- ❖ Los síntomas de la tos ferina pueden consistir en ataques de tos, de intensidad suficiente para causar vómito e incluso fractura de costillas. La enfermedad puede durar hasta tres meses y aún más, y originar neumonía, hospitalización y pérdida de días de trabajo o de escuela.
- ❖ Las vacunas no son solamente para bebés y para nuevos padres. Los expertos en salud, entre ellos los CDC y la AAFP, recomiendan que la mayoría de los adolescentes y adultos reciban una dosis única de la vacuna de refuerzo Tdap, en sustitución de la Td (toxoides de tétanos y difteria) para extender la protección contra tos ferina, si no se habían vacunado con Tdap o no están al día en sus vacunaciones.

Metodología de la encuesta

Esta encuesta fue realizada dentro de Estados Unidos a través de Internet por Harris Interactive, en nombre de la American Academy of Family Physicians ('Academia Estadounidense de Médicos Familiares'), del 8 al 10 de julio de 2009, mediante el servicio ómnibus en línea QuickQuerySM, entre 2,021 adultos de 18 años de edad y mayores. Esta encuesta en línea no se basa en una muestra probabilística y, por tanto, no permite hacer estimaciones del error de muestreo teórico. Se puede proporcionar a petición, la metodología completa de la encuesta.

Este programa ha sido posible gracias al financiamiento y apoyo de GlaxoSmithKline.